

Resultaten klinische revalidatie na een beroerte

Tijdens het revalidatietraject worden verschillende meetinstrumenten ingezet, zoals vragenlijsten en testen. Door de scores op deze meetinstrumenten van een grotere groep revalidanten te verzamelen kunnen we het effect van de behandeling bekijken.

Zelfstandigheid


Het resultaat van klinische revalidatie wordt gemeten met de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van de Klinische Revalidatie (USER). De USER meet in welke mate iemand

zichzelf zelfstandig kan verplaatsen, kan verzorgen en cognitief kan functioneren (communiceren, aandacht, geheugen en gedrag).


Bij 173 mensen na een beroerte werd de USER afgenomen bij start en einde van de klinische revalidatie. Rechts vind je de totaal scores voor verplaatsen, verzorgen en cognitief functioneren.

Hieronder zie je welk percentage van de revalidanten de activiteit zelfstandig kan uitvoeren.

Zelfstandigheid



Percentage revalidanten dat activiteit zelfstandig kon uitvoeren bij start versus einde revalidatie



Bronnen

De resultaten zijn gebaseerd op revalidanten die na een beroerte klinisch hebben gerevalideerd. Gegevens zijn meegenomen indien de eindmeting van de USER in 2024 is afgenomen.

Revalidatiekaart #1 | 2024